

紐普洛貼片 Neupro® 6mg/24h, 13.5mg/Patch (Rotigotine)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院
藥學部

❖ 為什麼要貼此貼片：

治療、控制帕金森氏症及相關症狀。

❖ 該如何使用此貼片：

- ✓ Neupro 每天貼一次。貼片應在每天同一時間貼於適當的部位，貼片應該貼在潔淨、乾燥、沒有損傷的皮膚表面，可以是腹部、大腿、臀部、側腰部、肩部或上臂。

如何黏貼 NEUPRO:

1. 每張貼片都被包裝在一個小袋中，打開包裝後先去掉保護膜的一半，將露出的有黏性的部分牢牢貼在皮膚上。
2. 將貼片向後翻起，再去掉保護膜的另一半，此時，不要觸摸貼片的黏性部分，用手掌將貼片按下，壓20-30 秒鐘，使貼片在皮膚上粘貼牢固。
3. 若須貼在有毛髮處，請先將毛髮剪除。

如何移除 NEUPRO:

1. 小心緩慢地撕除貼片。小心地將貼片對折(黏貼面對折互黏)然後丟棄。
2. 黏貼處以肥皂和清水搓洗以移除殘留於皮膚上的黏性物質(黏膠)。可使用嬰兒油或礦物油去除剩餘的黏

膠。

★ **使用藥品後可能會出現的副作用：**

常見副作用：噁心、頭痛、暈眩、影響睡眠、皮膚反應。

★ **懷孕或哺乳時該怎麼辦：**

準備懷孕或哺乳的婦女，請告知您的醫師。

★ **忘了用藥怎麼辦：**

如果忘記更換貼片，請在記起後盡量貼上新貼片。然後您仍可繼續依據您平常時間更換貼片。

★ **藥品該如何存放：**

1. 儲存溫度不高於 30°C。
2. 請將未使用的貼片存於密封包裝袋。
3. 請將貼片和所有藥物置於遠離孩童和寵物的地方。

★ **藥師的叮嚀：**

1. 若貼片掉落了，請將一片新的貼片貼在原來的位臚上。到您日常更換貼片的時間，再換上一片新的貼片。但應將貼片貼在不同的位臚上。
2. 貼片失去了黏性，應在一天中剩下的時間裡換用一張新的貼片。

3. 應避免在 14 天內重覆在同一部位使用貼片。不要將貼片用於發紅、受到刺激或損傷的皮膚上。
4. 熱源可能會使過多的藥物從 NEUPRO 貼片穿透您皮膚。當您貼有貼片時，請勿：
 - 在黏貼處使用加熱墊
 - 泡熱水澡
 - 洗三溫暖
 - 使黏貼處直曬日光。
5. 貼片有防水功能，您仍可泡澡、淋浴或游泳。
6. 如您需要做核磁共振(MRI)檢查時，需要先拿下貼片，檢查後再貼上一片新的貼片。
7. 使用貼片時請避免飲酒，以免增加思睡副作用。
8. 在剛開始使用貼片時，請勿駕車、操作機器或進行其他危險活動，直到您了解 NEUPRO 對您的影響。

參考文獻：廠商仿單

制定：106/11/30

修訂：113/03/29