

Novel oral Anticoagulants

新型口服抗凝血劑



高雄醫學大學附設中和紀念醫院
藥學部

⊛ 本院藥品品項：

| 學名 | 商品名/中文名 | 劑量 | 藥品外觀 |
|-------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| Dabigatran | Pradaxa / 普栓達膠囊 | 110mg/Cap | 長橢圓形、藍色、膠囊、R110 |
| | Pradaxa / 普栓達膠囊 | 150mg/Cap | 長橢圓形、藍色/白色、膠囊、R150 |
| Rivaroxaban | Xarelto/拜瑞妥膜衣錠 | 2.5mg/Tab | 圓形、淡黃色、錠劑、▽2.5/BAYER BAYER |
| | Xarelto/拜瑞妥膜衣錠 | 10mg/Tab | 圓形、粉紅色、錠劑、▽10/BAYER BAYER |
| | Xarelto/拜瑞妥膜衣錠 | 15mg/Tab | 圓形、棕色、錠劑、▽15/BAYER BAYER |
| Apixaban | Eliquis/艾必克凝 | 2.5mg/Tab | 黃色、圓形、錠劑、893/2 1/2 |
| | Eliquis/艾必克凝 | 5mg/Tab | 長橢圓形、粉紅色、錠劑、5/894 |
| Edoxaban | Lixiana/里先安膜衣錠 | 30mg/Tab | 粉紅色、圓形、錠劑、DSC L30 |
| | Lixiana/里先安膜衣錠 | 60mg/Tab | 圓形、土黃、錠劑、DSC L60 |

⊛ 為什麼要服用此藥品：

- ✓ 此為口服抗凝血劑，可預防血栓的形成。

★ 該如何使用此藥品：

請遵照依照醫師指示用藥，每天的服藥時間盡量保持固定，可於飯前或是飯後服用；請勿自行停藥，或自行增加或減少劑量。

★ 使用藥品後可能會出現的副作用：

1. 瘀血與出血風險增加，最常見包括皮膚瘀青或牙齦出血。
2. 副作用並非每個人都會發生，請依醫生指示服用藥品。

★ 忘了服藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

準備懷孕或哺乳的婦女，請告知您的醫師。

★ 藥品該如何存放：

1. 儲存於室溫陰涼乾燥處，避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

★ 藥師的叮嚀：

1. 服藥前，請確實告知醫師是否曾有出血問題（如腸

胃道出血或經期過長等)、中風、肝腎疾病、藥物過敏等問題。

2. 若您正在服用抗血小板藥物、抗凝血劑、止痛藥請於就診時，請確實告知醫師。
3. 讓所有照顧您的醫療人員知道您正服用此藥。
4. 應盡量避免從事易引起外傷之危險活動。
5. 避免割傷自己，小心使用牙刷或刮鬍刀，盡量選擇軟毛牙刷或電動刮鬍刀。
6. 確定身邊有足夠藥量，並遵循醫師指示服藥。
7. 若不小心服用過量，請立即告知您的主治醫師或就近就醫。
8. 若有不正常出血情況（如皮膚出血、糞便顏色突然變深或牙齦出血等），請立即告知您的主治醫師或就近就醫。
9. 若要動手術或複雜牙科手術，需告知醫師您正服用此藥，切勿自行停藥。

參考文獻：廠商仿單

制定：106/11/30

修訂：113/03/29