

憶思能穿皮貼片 Exelon Patch® (4.6mg/24h, 9.5mg/24h) Rivastigmine



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 為什麼要貼此貼片：

- ✓ 輕度至中度阿滋海默氏病之失智症。由膠囊或口服溶液轉換成貼片。

★ 該如何使用此貼片：

- ✓ 本貼片為一片米色的薄塑膠片，可黏於皮膚上。
- ✓ 一次只貼一片 Exelon 貼片於乾淨、乾燥、無毛且無損傷的皮膚上：上或下背部(左側或右側)、上臂(左臂或右臂)、左或右胸口。

如何黏貼：

1. 沿虛線剪開封袋，打開後取出貼片。保留封袋於丟棄時使用。剪切時避免損及貼片或過度凹折貼片。
2. 貼片的黏性面(接觸面)覆蓋有保護襯片。將保護襯片的一邊剝開。請勿讓您的手指碰觸貼片的黏性面
3. 將貼片的黏性面貼在您所選擇的皮膚部位。
4. 將保護襯片的另一邊剝開，按緊貼片，確保各邊緊密黏附。
5. 貼上貼片後，用肥皂和清水洗淨雙手。

★ 使用藥品後可能會出現的副作用：

- ✓ 常見副作用：搔癢、憂鬱、頭痛、焦慮、眩暈、胃痛、肌肉無力、疲倦、睡眠障礙、體重減輕
- ✓ 可能嚴重副作用：噁心、嘔吐、腹瀉、食慾減低、胃出血(潰瘍)、心臟方面的問題、癲癇、動作方面的問題(震顫)。

★ **懷孕或哺乳時該怎麼辦：**

準備懷孕或哺乳的婦女，請告知您的醫師。

★ **忘了用藥怎麼辦：**

1. 忘記用藥時，應立即貼上新的貼片，到了隔天的給藥時間，再換貼另一片貼片，不可同時貼二片來補償忘記貼的劑量。
2. 若您漏貼Exelon貼片已超過3天，請在貼上新貼片之前聯絡您的醫護人員。您可能需要以較低劑量的Exelon重新開始治療。

★ **藥品該如何存放：**

1. 儲存溫度為 25°C 儲存。
2. Exelon Patch 在使用前應密封保存在個別的保護袋中。

★ **藥師的叮嚀：**

1. Exelon Patch 僅供經皮吸收使用（貼於皮膚上）。貼片的袋子封口若被破壞，或貼片被裁剪、破損、或有任何改變時，不可使用。
2. 使用過的貼片，應將粘貼面向內對摺壓緊，並小心丟棄。放進原來的貼片保護袋中，丟棄在兒童及寵物看不到及無法取得的地方。
3. 貼片粘貼的部位應輪流替換以減少對皮膚的刺激，相同的部位在 14 天內不可重覆粘貼。

4. 在不同部位的皮膚貼上新的貼片前，應先將前一天貼的貼片撕下來。
5. 貼片應每 24 小時更換一片，且每日粘貼的時間應一致(可用原子筆在 Exelon 貼片上寫下您貼附的日期與時間)，若將之排入每日固定的作息時間表，可能會有幫助。
6. 使用 24 小時後，貼片上仍有藥量殘留，要避免接觸到眼睛，處理完貼片後要洗手。
7. 避免將貼片長時間曝露在外部的熱源（過度日曬、三溫暖、日光浴）。
8. 不可再服用 Exelon 膠囊或 Exelon 口服液劑及其他具有膽鹼作用的藥品。
9. 會導致困倦、眩暈、虛弱或昏暈。在瞭解 Exelon 貼片對您的影響之前，請勿駕駛或操作重型機械或從事其他高風險性活動。

參考文獻：廠商仿單

制定：106/11/30
修訂：113/03/29