吸必擴®氣化噴霧劑
Symbicort Rapihaler®
（Budesonide+formoterol）

衛教單內容

操作影片

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

✪ 醫師為什麼會開此藥：

治療呼吸道阻塞疾病、氣喘、及使用支氣管擴張劑及皮質類固醇組合療法之病患。

✪ 此藥品該如何使用：

準備您的吸入器：



如果您的吸入器是新的、或已有一週以上未使用，或曾掉落過，則輕輕搖晃它 5 秒，並直立對空按壓 1 次，之後再輕輕搖晃它 5 秒，並再次對空按壓 1 次準備使用。

開始使用：

1. 每次使用前輕輕搖晃吸入器 5 秒。
2. 移開吸嘴蓋，並確定吸嘴處無異物。
3. 如上圖所示，將拇指放在吸入器底部，食指放在頂部，使吸入器直立在嘴巴前方(吸口在下)。
4. 先對外用力呼一口氣，接著含住吸嘴。深吸氣同時，以食指按壓吸入器，嘴巴同時緩慢地深深吸氣，將藥物深吸到肺部。
5. 之後閉氣約 10 秒，然後把吸入器從口中移出。
6. 按照醫師指示，如果需要吸入第二個劑量，請間隔 30 秒鐘後再使用下一劑。 (重複步驟 1~5)
7. 記得蓋上吸嘴蓋，防止灰塵及其他碎片進入。

8. 每次使用完藥物，記得要把頭後仰，深喉嚨漱口，並將漱口水吐掉，以避免藥物殘留。

✪ 使用此藥品該注意什麼：

✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。

✓ 口含器需時常保持清潔，可用清水清洗後陰乾。

✓ 藥品罐為加壓器，不可強力打開或暴露於 50℃以上之溫度，請勿擠壓、燃燒，並不可將金屬罐自塑膠外殼中取出或放入水中。

✪ 服藥後可能會出現的副作用：

聲音嘶啞、發音困難、喉嚨刺激、頭痛、口腔及喉嚨的念珠菌感染、心悸。

✪ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論。計劃授乳的婦女，請於開始用藥前告知您的醫師或藥師。

✪ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補用一個劑量，若想起的時間已接近下次用藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

✪ 藥品該如何存放：

請放置在室溫的陰涼乾燥處，不建議放在過熱或陽

光可照射到的地方。使用後請務必蓋緊瓶蓋。

✪ 何時該更換藥品 ：

1. 吸入器頂部附有計數器，其上的箭頭指出吸入器中剩下多少劑量。
2. 當劑量窗口中間出現 0 時，表示藥物已經用完。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01
修訂：114/03/31