


# Beta-blockers

## 乙型交感神經阻斷劑



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

## ★ 本院藥品品項：

學名	商品名	劑量	藥品外觀
Propranolol	Propranolol 心律錠	10mg/tab	紅色/圓形/錠劑/剝痕
Bisoprolol	Concor 康肯錠	5mg/tab	黃色/心形/錠劑/剝痕
		1.25mg/tab	白色/圓形/錠劑
Carvedilol	Carvedilol Hexal 卡菲蒂羅錠	25mg/tab	白色/特殊形狀/錠劑/C4/ 剝痕
		6.25mg/tab	土黃/特殊形狀/錠劑/C2/ 剝痕
Nebivolol	Nebilet 耐比洛錠	5mg/tab	白色/圓形/錠劑/十字剝痕
Atenolol	Mirobect 脈樂必克錠	50mg/tab	白色/長橢圓形/錠劑/WD
Labetalol	Labtal 壓血泰	200mg/tab	橘色/圓形/錠劑 /SINPHAR/剝痕

## ★ 為什麼要服用此藥：

本藥可降低心跳速率與血壓，降低心臟負荷，改善左心室功能/減緩心臟衰竭病程，常用於治療高血壓、心律不整、心絞痛、心臟衰竭、心肌梗塞等疾病。

## ★ 該如何使用此藥品：

請依照醫師指示服藥，請勿自行停藥、自行增加或減少藥物劑量，突然停藥可能引起胸痛或心臟病發作。

## ★ 忘記服藥怎麼辦：

當您想起時，盡快補服一個劑量。

若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

## ★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

準備/可能懷孕或哺乳的婦女，請告知您的醫師。

## ★ 藥品該如何存放：

1. 儲存於室溫乾燥處（30°C以下），避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 請勿將您的藥物提供給他人使用。

## ★ 使用藥物後可能會出現的副作用：

1. 本類藥物會使心跳變慢，可能伴隨頭痛、頭昏、虛弱無力、疲勞、皮疹、喘鳴、短暫性加重呼吸短促及體液滯留等症狀，若症狀持續惡化，請就診治療。
2. 若有呼吸困難、四肢腫脹、胸痛，且伴隨心跳不規律或過慢，請盡速就醫治療。
3. 副作用並非每個人都會發生，請勿過於擔心。

## ★ 藥師叮嚀：

1. 對藥物過敏、有氣喘、腎臟、肝臟、糖尿病、甲狀腺疾病患者，請先告知醫師或藥師。
2. 使用該類藥物之前後，建議先測量自己的脈搏，若脈搏每分鐘小於50以下並且伴隨頭暈無力，應先停藥，並諮詢醫師或藥師（可撥打藥袋背面諮詢電話）。
3. 服藥期間，建議每天固定時間監測血壓與脈搏並記錄，回診時可提供給醫師評估。
4. 初期使用本藥可能會覺得頭暈不舒服，緩慢的起身動作可以減輕這個現象，請不要突然停藥，避免胸痛或心臟病發作。
5. 服藥期間若出現睏倦或暈眩的情形，請避免開車、操作機械或從事具有危險性的工作。
6. 若有糖尿病或甲狀腺疾病，請事先告知醫師，因服用本類藥物可能使低血糖與甲狀腺疾病症狀不明顯（會遮蔽心搏過速、手抖等症狀）。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01  
修訂：113/03/29