

必肺宜氣化噴霧劑

Bevespi Aerosphere® (Glycopyrronium /Formoterol fumarate dihydrate, 120 dose/Bot)



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

治療慢性阻塞性肺病病人氣流阻塞之長期維持治療。

★ 此藥品該如何使用：

第 1 次使用

請移除吸口蓋，充分振搖吸入劑後，對空釋放一次噴霧，此步驟請重複 4 次；若超過一星期未使用，請充分振搖後，對空釋放 2 次噴霧，再使用。

使用方法

1. 移開吸入劑的塑膠蓋子，裝上白色半透明的輔助器。將吸入劑直立於拇指與食指之間（吸口在下），拇指放在底部。
2. 將吸入劑充分振搖後，先吐一口氣，再將輔助器含入口中。
3. 深吸氣的同時，以食指按壓一次吸入劑，將藥品緩慢地深吸到肺部。
4. 之後閉氣 5-10 秒鐘再恢復呼吸，若需要使用第 2 劑，請間隔 30 秒鐘後再使用下一劑。(重複步驟 2.至 4.)
5. 將輔助器取下擦拭清潔，並擦拭吸入劑吸嘴，將蓋子蓋回吸嘴。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 輔助器需時常保持清潔，可用清水清洗後陰乾，但勿用刷子刷洗。
- ✓ 藥品罐為加壓器，不可強力打開或暴露於 50°C 以上之溫度，請勿擠壓、燃燒，並不可將金屬罐自塑膠外殼中取出或放入水中。
- ✓ 此藥不能拿來當作急救用藥。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

咳嗽、尿路感染、頭痛、頭暈、口乾。若有無法耐受之副作用情形，請儘速回診告知醫師。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論。計劃授乳的婦女，請於開始用藥前告知您的醫師或藥師。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補用一個劑量，若想起的時間已接近下次用藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

★ 藥品該如何存放：

請放置在室溫的陰涼乾燥處，不建議放在過熱或陽光可照射到的地方。

★ 何時該更換藥品：

1. 當可吸入次數即將用完時，劑量顯示器的窗口背景顏色會變“紅色”，請儘速回診領取新的吸入劑。
2. 當劑量顯示器的窗口顯示為“0”時，就一定要換新，此後任何按壓所噴出的藥量可能無法給予病患完整劑量。

參考文獻：廠商仿單

制定：111/03/28

修訂：113/03/29