

百滅寧 軟膏

Permethrin 5%

(Permethrin)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院
藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥？

用於疥瘡之治療。

★ 該如何使用這個藥？

1. 洗澡沐浴後至少一小時，本藥膏方可塗抹於皮膚上。
2. 請將本藥膏薄薄且均勻從脖子塗抹到腳底，全身都要塗抹，如背部、腋窩、屁股縫、會陰部、肚臍、手指間、腳趾縫、指甲縫等較不易塗抹部位均須徹底塗遍，不應只塗抹發癢部位。
3. 老人家或兒童可能需要塗抹到頸部以上的部位(若醫師有指示)，須避開嘴巴及眼睛周圍。
4. 塗抹藥後請穿著寬鬆之衣物(避免將塗藥處密不通風的完全覆蓋住)，靜待8-14小時後(正確時間請依醫囑)將全身完全洗淨並換上乾淨衣物。

★ 使用藥物後可能會出現的副作用：

1. 疥瘡較嚴重的患者，使用藥膏偶爾會出現輕微且短暫的皮膚刺激感。

2. 若您抹藥後持續出現皮膚刺激、發紅或皮膚疹等現象時，請主動告知醫師或及早回診。

★ 其他注意事項

1. 曾對本藥膏成分過敏或對除蟲菊精/類除蟲菊精相關成分過敏者不適用本藥。
2. 塗抹藥物前，若皮膚或患處上已塗有任何乳液或藥膏等製劑時，請先將其擦除。
3. 本藥膏應避開口、鼻及眼睛處塗抹；若不慎碰觸眼睛，則應持續以清水沖洗 2~3 分鐘。
4. 若您已懷孕或為授乳婦時，請於用藥前先告知醫師。
5. 為他人塗抹本藥時，請先戴上拋棄型塑膠手套再取藥膏，並以此方式為病人塗抹；抹藥後請將手套丟棄並洗淨雙手。
6. 未經醫師指示，請勿多次使用此藥。若擅自使用超過醫囑指示次數時，則可能會對病人造成傷害。
7. 疥蟎通常暴露在 50°C 的環境中 10 分鐘，或離開人體 2 至 3 天後即會死亡，故於開始接受治療前 3 天內，使用的衣物及床被單等均須用 60°C 以上的熱水清洗並以高熱乾燥，或進行乾洗，無法清洗或乾洗的衣物，密封於塑膠袋 1 至 2 週。患者的衣物要與其他入

的衣物分開清理，並持續高溫處理至完成治療為止。
房間建議使用吸塵器清理。

8. 接受治療後，即使寄生於皮膚中的疥蟎及蟲卵已清除，皮膚癢及紅疹的症狀可能會持續約一個月才會全部解除，可就醫並由臨床醫師視個人狀況開立止癢的藥品以緩解症狀。若接受治療後 2 至 4 週仍有皮膚癢或再度出現紅疹等症狀，請再次就醫尋求專業協助。

★ 藥品該如何存放：

儲存於室溫乾燥處、小孩不易拿取之處。



參考文獻：廠商仿單、疾管署網站

制定：112/03/31

修訂：113/03/29