

噴立停鼻用噴液劑
Azetin[®] Nasal Spray
(Azelastine 140 mcg/Dose, 120
Dose/Bot)



衛教單內容

操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：
過敏性鼻炎。

★ 該如何使用：

- ✓ 請遵照醫師指示。
- 通常一天二次，固定時間使用。

★ 結構說明：




★ 第一次使用前準備：

1. 先移除安全環和蓋子



2. 垂直拿著鼻噴劑，並將噴嘴向外。



3. 對空噴藥劑 7-10 次按壓，以確保噴出的藥霧量均一。



★ 每日操作步驟：

1. 先擤清鼻孔，並取下蓋子。



2. 頭稍微向前傾。
3. 將噴嘴放進鼻腔，朝外側噴(遠離鼻中膈)。



4. 用鼻子吸氣時，將瓶頸環座壓到底。
5. 移除噴嘴並用口呼氣。
6. 使用完畢，以乾紙巾擦拭噴嘴並蓋回蓋子。



✓ 若兩側鼻孔都要噴，請移至另一邊鼻孔，重複步驟 3、4、5。

✪ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 請勿往鼻中膈方向噴。
- ✓ 請勿使用任何針或利器戳噴嘴。
- ✓ 噴藥的時候頭前傾，保持藥瓶直立。
- ✓ 若超過 24 小時未使用，請對空噴壓一次。
- ✓ 不可將您使用的藥品給您的家人或朋友使用。
- ✓ 孕婦或授乳婦請先與醫師討論。
- ✓ 應避免同時服用含酒精類溶液及其他中樞神經抑制劑，因為可能會加強中樞神經抑制劑作用。

✪ 用藥後可能會出現的副作用：

- ✓ 可能的副作用有鼻黏膜刺痛、發癢、頭痛、思睡、口乾、鼻出血等副作用。
- ✓ 給藥後可能會產生苦味(噴藥時頭部後傾)。

✪ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快使用一個劑量，若想起時已接近下次用藥時間，則不使用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

✪ 藥品該如何存放：

- ✓ 存放於室溫 25 度以下、避免陽光直接照射。
- ✓ 保持瓶口向上的狀態。





參考文獻：廠商仿單

制定：113/02/20
修訂：113/03/29