

尼古清戒菸噴霧 nicorette®

QuickMist 1mg/spray

Mouthspray nicotine



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部


★ 醫師為什麼會開此藥：

輔助戒菸用藥。

★ 此藥品該如何使用：

1. 使用時將黑色按鈕壓住並同時向上滑動直到噴頭


卡榫定位，會出現「喀」聲。



2. 如果是第一次使用或長時間未使用，請大力按壓

頂端並噴灑於面紙確認噴劑功能，直到能噴出均勻

霧狀。



*注意事項：

尼古清戒菸噴霧含少量酒精，使用時勿噴向眼睛。如不慎噴入眼睛，請立即以清水徹底沖洗。

3. 對著舌下或口腔黏膜兩側，用力按壓噴頭一下。



*注意事項：

為了得到最佳效果，請避開嘴唇；
不要立即吞嚥或吸氣，靜待幾秒之後
再吞嚥，不要吸入噴劑及往喉嚨噴灑，
避免過度刺激、感到不適。

4. 若菸癮無法在兩分鐘內緩解，請再噴一次。

5. 若要將噴嘴收回，將按鈕下滑直到可被向內輕推；

接著，邊推入邊滑下以鎖住。



*用法用量：

- ✓最高用量：每次使用請勿超過2噴。
- ✓每小時：請勿超過4噴。
- ✓每天：請勿超過64噴。

★用藥後可能出現的副作用：

若發生以下副作用，例如：口腔、唇、喉嚨及舌頭腫脹、
皮膚癢、皮膚腫脹、口腔內壁潰瘍及發炎等，請立即
停止使用，並接受醫師診治。

★保存方式：

1. 勿讓兒童觸及。請存放於遠離兒童及動物的地方。

兒童吸取高劑量尼古丁會非常危險甚至致命。

2. 請存放於室溫陰涼處，避免陽光直射。

★注意事項：

1. 避免使用的族群：對尼古丁任何成分過敏、18歲

以下及從未吸菸者。

2. 懷孕、哺乳婦女使用本產品前請先向醫師諮詢。

3. 勿將噴嘴朝向他人或寵物。

4. 使用時請將藥品保持直立，以免吸管吸不到藥液。

參考文獻：廠商仿單

制定：113/07/19