

滅菌靈懸液用粉劑

Mycostatin

for oral suspension

100000 unit/mL, 24 mL/Bot

(Nystatin)



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

預防和治療由白色念珠菌所引起之口腔或腸內感染等。

★ 此藥品該如何使用：

✓ 依照醫師指示劑量口服使用。

<p>1</p>  <p>洗淨雙手</p>	<p>2</p>  <p>打開瓶蓋，移除封口膠膜</p>
<p>3</p>  <p>以量杯準備 23 毫升冷開水， 並倒入藥瓶中</p>	<p>4</p>  <p>將瓶蓋旋緊，用力振搖均勻 直到溶液呈現乳黃色狀</p>
<p>5</p>  <p>依照醫師指示使用滴管滴入 或量杯使用正確劑量</p>	<p>6</p>  <p>服藥後在口中停留數分鐘， 在醫師指示下吞下或吐掉</p>

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 請遵照醫師指示於正確時間服藥，不可隨便停藥或更改劑量。
- ✓ 如出現刺激性症狀，請立即回診告知醫師。
- ✓ 若需同時併用其他藥品，請先使用其他藥品後，再使用此藥品。
- ✓ 用此藥品前先清潔口腔衛生，包括假牙的正確清潔。
- ✓ 此藥品為懸液劑，故呈現乳黃色為正常現象。
- ✓ 使用後 30 分鐘內，避免進食或飲水。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

- ✓ 偶爾會出現腹瀉、腸胃不適、噁心嘔吐的症狀。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

- ✓ 孕婦或哺乳婦女應告知並與您的醫師討論。

★ 忘了用藥怎麼辦：

- ✓ 當您想起時盡快補上應使用劑量，若已接近下次用藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

★ 藥品該如何存放：

- ✓ 尚未泡製的藥品：可使用至藥品外盒之有效期限，請放置於 25°C 以下的陰涼乾燥處。
- ✓ 泡製好的藥品：請鎖緊瓶蓋，可在室溫保存 7 天。
- ✓ 請避免將藥品放置在兒童容易拿取的地方。



參考文獻：廠商仿單

制定：113/08/20