

艾能舒[®]吸入膠囊

Enerzair[®] Breezhaler[®]

**(Indacaterol 150 mcg/
Glycopyrronium 50 mcg/
Mometasone furoate 160 mcg
30 Cap/Box)**



衛教單內容

操作影片




高雄醫學大學附設中和紀念醫院
藥學部


★ 醫師為什麼會開此藥：

此藥品可局部作用於呼吸道，產生支氣管擴張作用，並減緩肺部發炎反應，作為氣喘的維持治療。

★ 此藥品該如何使用：

- ✓ 經由口部吸入使用，請勿吞服膠囊。
- ✓ 每日劑量：每天一次固定時間使用或依照醫師指示。



7  放開兩側按鈕	8  向外吐氣，勿朝口含器吐氣
9  深吸藥物，勿按壓兩側按鈕	10  盡量閉氣 5~10 秒
11  檢視膠囊 1. 若膠囊內有粉末殘留： 重複吸藥步驟 8~10 2. 若膠囊已無粉末殘留： 將空膠囊丟入垃圾桶	12  漱口 每次用藥後請口中含水 仰天漱口，發出咕嚕咕嚕聲 漱口至喉嚨深部並吐出

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 請勿將膠囊壓出鋁箔，以避免膠囊變形。
- ✓ 請勿以潮濕的手拿取膠囊。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

聲音沙啞、頭痛、心跳過快、震顫、口腔念珠菌感染。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

孕婦或哺乳婦女應告知並與您的醫師討論。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時，應儘速在同一天內使用藥品，一天內請勿使用超過一次的劑量。

★ 吸入器的清潔方式：

使用後應以乾淨、乾燥不掉屑的紙巾擦拭口含器內外，以除去任何的殘餘粉末。

吸入器應保持乾燥，不建議用水清洗，但若有特殊狀況需清洗時，請確保下次使用前吸入器完全乾燥再使用，以避免乾粉受潮。

★ 藥品該如何存放：

應存放於陰涼乾燥處，膠囊平時必須存放在鋁箔片中，只能在使用前取出，以防潮和避免光線直射。

★ 何時該更換藥品：

一盒藥品包含 30 顆膠囊，使用完畢後更換。

未開封的膠囊可使用至藥品外盒的有效期限。