

帝伏寧鼻用噴液劑  
**Dufanas<sup>®</sup> Nasal Spray**  
(Azelastine, Fluticasone  
**137/50 mcg/Dose, 120 Dose/Bot**)



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：  
過敏性鼻炎。

★ 該如何使用：  
請遵照醫師指示。

通常一天二次，固定時間使用。

★ 結構說明：



★ 第一次使用前準備：


1. 先移除保護蓋



2. 輕輕搖晃瓶身，拇指頂住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座，噴嘴向外。



3. 對空噴藥劑數次(通常小於6次)，直到看見噴霧，以確保噴出的藥霧量均一。



## ★ 每日操作步驟：

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 先擤清鼻腔，清洗雙手，搖晃藥瓶 5-10 秒，並取下防塵蓋。</p>  <p><small>Created by Melissa Miller from Nasa Project</small></p> | <p>2. 頭稍微向前傾。<br/>3. 將噴嘴放進鼻腔，並用手指壓住另一側鼻孔，朝外側噴(離開鼻中膈)。</p>  <p><small>Created by Melissa Miller from Nasa Project</small></p> | <p>4. 用鼻子吸氣時，將瓶頸環座壓到底，然後從嘴巴慢慢吐氣。<br/>5. 使用完畢，以乾紙巾擦拭噴嘴並蓋回。</p>  <p><small>Created by Joyce Smith from Nasa Project</small></p> |
| <p>若兩側鼻孔都要噴，請移至另一邊鼻孔，重複步驟 3、4、5。</p>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |

## ★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 使用前先振搖 5-10 秒。
- ✓ 請勿往鼻中膈方向噴。
- ✓ 請勿使用任何針或利器戳噴嘴，這樣會造成無法獲得正確藥物劑量。
- ✓ 若噴霧劑無法操作時，可能是因為噴嘴阻塞，可將噴嘴取下，浸泡在溫水中，或取下噴嘴，將噴嘴朝下，以溫水沖洗，完全晾乾後，將噴嘴和保護蓋裝回瓶子。重新試壓至看見噴霧可正常使用為止。
- ✓ 若超過 14 天未使用，請對空噴壓一次。
- ✓ 不可將您使用的藥品給您的家人或朋友使用。
- ✓ 孕婦或授乳婦請先與醫師討論。
- ✓ 應避免同時服用含酒精類溶液及其他中樞神經抑制劑。
- ✓ 使用期間若有視力改變請儘速回診。
- ✓ 若有青光眼、白內障病史，請主動告知醫師。
- ✓ 勿將頭向後仰避免藥物進入喉嚨。若藥物進入喉嚨，口腔產生苦味是正常的。



### ✪ 用藥後可能會出現的副作用：

可能的副作用有鼻黏膜刺痛、發癢、頭痛、思睡、口乾、鼻出血等副作用。

### ✪ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快使用一個劑量，若想起時已接近下次用藥時間，則不使用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

### ✪ 藥品該如何存放：

- ✓ 開封後有效期限為三個月。
- ✓ 存放於室溫 25 度以下、避免陽光直接照射，請勿儲存於冷凍庫或冰箱。
- ✓ 存放時保持瓶口向上。



參考文獻：廠商仿單

制定：114/02/18  
修訂：114/03/31