

易週糖[®]注射劑 Trulicity[®] (Dulaglutide 1.5 mg/Pen)



衛教單內容

操作影片




高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

✪ 醫師為什麼會開此藥：

治療第二型糖尿病


✪ 結構說明：



✪ 該如何使用：一週使用一次皮下注射（注射前請清洗雙手）。


步驟 1：打開基座蓋

- (1) 確認注射筆處於紅色上鎖狀態。
- (2) 要施打前再垂直向下拉開灰色蓋子，把蓋子丟掉
- (3) 灰色蓋子不可再蓋回去，以免損壞針頭。
- (4) 不要觸碰針頭




步驟 2：放置並解鎖

- (1) 用酒精棉片由內而外消毒注射部位，等酒精乾後才可注射。
- (2) 將透明基座平放並且緊壓住注射部位的皮膚。
- (3) 旋轉上鎖環至綠色位置來解鎖。
- (4) 注射筆一定要緊壓皮膚再解鎖，避免太早按注射鈕而浪費一劑藥物。




步驟 3：注射鈕按住不放

- (1) 按住綠色注射鈕不放，將會聽到一次喀聲。
- (2) 持續將注射筆緊貼住皮膚，直到聽到第二次喀聲。
- (3) 停留 5-10 秒鐘後，再將注射筆從皮膚移開。
- (4) 看到注射筆內的灰色活塞時，代表藥物注射完畢。



注射部位

- (1) 注射部位可選擇腹部(距肚臍 5 公分之外的區域)、上臂(外側中段)或大腿(前外側上 1/3 處)的皮下。
- (2) 每週注射部位建議輪替，避免同一個部位重複注射。



★ 該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 注射前，檢查易週糖[®]溶液中是否有微粒狀的物質與變色。
- ✓ 注射後不可按摩注射部位，避免加速藥物吸收，導致血糖值起伏過大。
- ✓ 注射部位需要輪替。
- ✓ 注射筆使用後請放入塑膠硬瓶中，返院時交給醫療人員處理，請勿丟棄至家用廢棄物中。

☼ 用藥後可能會出現的副作用：

- ✓ 如有低血糖現象，如飢餓感、眩暈、冒冷汗、顫抖、心悸、視力模糊、無力、昏昏欲睡等，請盡快食用果汁或糖果。嚴重低血糖發生昏迷時，不可進食，應立即送醫。
- ✓ 若注射部位有紅、疼痛、腫塊，應避免注射此位置。如果症狀仍持續，應告知醫師。
- ✓ 若有腸胃道不良反應，例如腹瀉、腹脹、嘔吐等情況且持續發生請立即回診告知醫師。

☼ 忘了用藥怎麼辦：

- ✓ 若錯過一劑易週糖，且距離下一次預定給藥時間至少3天(72小時)以上，請立即注射；若距離下次預定給藥時間不到3天，請跳過這一劑。
- ✓ 若有需要，可以改變每週給藥的日子，但前後兩劑之間隔必須為3天以上，切記不可一次施打雙倍的劑量。

☼ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

- ✓ 懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。



☼ 藥品該如何存放：

- ✓ 未使用過的注射筆請放在冰箱中冷藏(2 至 8°C)，不可冷凍。
- ✓ 若注射筆無法冷藏，於室溫(低於 30°C)最久可放置 14 天。
- ✓ 為避免誤用，請將藥品放置於小孩不易拿取之處。
- ✓ 建議將筆存放在原包裝盒中，避免直接熱源和光線的照射。
- ✓ 注射筆有玻璃結構，如果掉落在堅硬的表面上，請更換一支新的注射筆進行注射。



參考文獻：廠商仿單

制定：114/04/22

修訂：114/04/29