

胰妥讚注射劑

Ozempic[®]solution for injection

(Semaglutide 4mg/Pen)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院版權所有 110.11月製





高雄醫學大學附設中和紀念醫院
藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

治療控制不良的第二型糖尿病病人。

★ 此藥品該如何使用：

藥品每週注射一次，可在一天中的任何時間注射。

	<p>檢查注射筆，並裝上新針頭 檢查注射筆溶液是否透明無色，消毒橡皮塞頭後，裝上新的針頭，取下內、外蓋。</p>
	<p>排空測試 <u>新的筆針第一次使用先做排空測試：</u> 旋轉劑量設定鈕至排空符號  (若不是第一次使用則跳過此步驟) 按住給藥按鈕，直到歸零，看到針尖有一滴藥液即完成排空。</p>
	<p>設定劑量 轉動劑量鈕至處方劑量。</p>

	<p>進行注射</p> <p>消毒皮膚後，將針垂直刺入皮膚，按壓至劑量計數器顯示為0，針尖先不要拔出，然後慢慢數到6，確保藥劑完全注入再拔出。</p>
	<p>移除針頭</p> <p>從針頭前端套入針頭外蓋，旋轉取下針頭並丟棄。</p> <p>將筆蓋套回注射筆</p>
	<p>注射部位</p> <p>腹部左右兩側(肚臍周圍2.5公分內區域不可施打)、大腿上方外側、上臂中段外側。</p> <p>每次注射部位必須輪替。</p>

★ 使用此藥品該注意什麼：

1. 本藥併用胰島素或其他促胰島素分泌劑，可能會增加低血糖的風險。
2. 若有低血糖症狀(如冒冷汗、心悸、頭暈、皮膚蒼白、過度飢餓、發抖、虛弱無力)，趕快補充含糖食物。
3. 使用後的針頭，請收集於硬塑膠或鐵製的有蓋容器內，再拿至醫療院所回收，不可丟棄於一般垃圾桶中。
4. 注射後可輕壓注射部位不可搓揉，應規律變換施打位置，避免產生腫塊。

5. 轉上針頭時要平行，避免折針導致藥液打不出來。

◆ 施打藥物後可能會出現的副作用：

低血糖、噁心、腹瀉、嘔吐（通常第二劑後改善）。

◆ 忘了用藥怎麼辦：

若忘記注射，可在 5 天內補打，超過 5 天則跳過，依原訂時程施打下一劑，兩次注射間隔至少 3 天（72 小時）。

◆ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕哺乳病人不可使用此藥。

◆ 藥品該如何存放：

未使用前：冰箱冷藏 $2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$ ，勿冷凍。

使用中：可存放於 30°C 以下或冷藏，保存期限為 6 週。



參考文獻：廠商仿單

制定：114/09/14

修訂：115/01/07