

猛健樂®注射筆

Mounjaro®KwikPen (Tirzepatide)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部





★ 醫師為什麼會開此藥：

第二型糖尿病病人的輔助治療或體重控制。

★ 此藥品該如何使用：

藥品每週注射一次，可在一天中的任何時間注射。

	<p>清潔雙手</p> <p>檢查注射筆，並裝上新針頭 檢查注射筆溶液是否透明無色，消毒橡皮塞頭後，裝上新的針頭，取下針頭內、外蓋。</p>
	<p>排空測試</p> <p><u>每次使用前要確實排空：</u> 旋轉劑量設定鈕轉至2聲「喀擦」聲並可在視窗看到長線條。 針頭朝上按住給藥按鈕，直到歸零，看到針尖有一滴藥液即完成排空。 此步驟最多能重複2次，否則就要更換新針頭，再嘗試一次。</p> 

 <p>調撥</p>	<p>設定劑量 按醫囑指示轉動至施打劑量。</p>
 <p>推動 按住 5 秒</p>	<p>進行注射 消毒皮膚後，將針垂直刺入皮膚，按壓製劑量計數器顯示為0，針尖先不要拔出，然後慢慢數到5，確保藥劑完全注入再拔出，拔出後針尖有一滴藥液是正常的。</p>
 <p>移除針頭 從針頭前端套入針頭外蓋，旋轉取下針頭並丟棄。 將筆蓋套回注射筆</p>	<p>移除針頭 從針頭前端套入針頭外蓋，旋轉取下針頭並丟棄。 將筆蓋套回注射筆</p>
 <p>注射部位 腹部左右兩側(肚臍周圍5公分內區域不可施打)、大腿上方外側、上臂中段外側。 每次注射部位必須輪替。</p>	

● 使用此藥品該注意什麼：

1. 本藥品為多劑量預充填筆型，可提供4個劑量。
2. 本藥併用胰島素或其他促胰島素分泌劑，可能會增加低血糖的風險。

- 若有低血糖症狀(如冒冷汗、心悸、頭暈、皮膚蒼白、過度飢餓、發抖、虛弱無力)，趕快補充含糖食物。
- 每次都要更換新針頭，使用後的針頭，請收集於硬塑膠或鐵製的有蓋容器內，再拿至醫療院所回收，不可丟棄於一般垃圾桶中。
- 注射後可輕壓注射部位不可搓揉，應規律變換施打位置，避免產生腫塊。
- 轉上針頭時要平行，避免折針導致藥液打不出來。

★ 施打藥物後可能會出現的副作用：

低血糖、噁心、腹瀉、嘔吐（通常第二劑後改善）。

★ 忘了用藥怎麼辦：

若忘記注射，可在 4 天(96 小時)內補打，超過 4 天則跳過，依原訂時程施打下一劑，每週注射間隔至少 3 天 (72 小時)。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕或哺乳病人請告知醫師。

★ 藥品該如何存放：

未使用前：冰箱冷藏 2°C - 8°C，勿冷凍。

使用中：可存放於 30°C 以下或冷藏，保存期限為 30

天。

參考文獻：廠商仿單

制定：114/09/14

修訂：115/01/07